

17 DE ENERO DE
2015

APRENDE MÁS


- ⇒ ¿Cómo viven?
- ⇒ ¿Cuál es su hábitat?
- ⇒ ¿Cuánto tiempo viven?
- ⇒ ¿Con qué nombres se lo conoce?
- ⇒ ¿Cuál es su depredador?



TITULOS

PRESENTACIÓN	2
HABITAT	2
CURIOSIDAD	2
VOCALIZACIONES	3
REPRODUCCIÓN	3
AMENAZAS	4
PARA COLOREAR	4

GACETA ANIMAL



EL CHARRÁN ÁRTICO

EIGAVIOTÍN ÁRTICO o CHARRÁN ÁRTICO es un ave de tamaño mediano. Miden 33-39 centímetros de largo y tienen una envergadura de 76-85 cm. Sus plumas son principalmente grises y blancas, con unas patas rojas y un pico también rojo, tan largo como la cabeza, recto, con una unión pronunciada de las ramas mandibulares; tiene una frente blanca, una nuca y coronilla negros con rayas blancas, y unas mejillas blancas. ; que tiene la migración

más larga del reino animal, al recorrer de polo a polo en busca de un mejor clima y lugar de reproducción.

El charrán ártico es un ejemplo de migrador de larga distancia, efectuando movimientos regulares entre ambos polos, desde las zonas de cría en el Ártico, a las de invernada en el Antártico.





*"probablement
e reciba en su
cuerpo más luz
solar durante
un año natural
que cualquier
otra criatura
en la Tierra"*


El **charrán ártico** (*Sterna parasae*), también llamado **golondrina de mar**, durante su época de reproducción se encuentra muy al norte, donde los días de verano son largos, y durante los inviernos viaja hasta el hemisferio sur, donde aquí los días son más largos de

PRESENTACIÓN

noviembre a febrero. Esto significa que el charrán ártico, probablemente reciba en su cuerpo más luz solar durante un año natural que cualquier otra criatura en la Tierra, de ahí que algunos le llamen el **ave del Sol**. Los viajes de larga distancia de las gaviotas o golondrinas del ártico

son bien conocidos, tanto entre los investigadores como el público en general. Ahora, por primera vez, los avances tecnológicos han permitido seguir el charrán ártico en su viaje inmenso, casi de polo a polo.

HABITAT



El charrán ártico tiene una distribución circumpolar y continua. Se lo puede encontrar en regiones costeras de las partes templadas frías de Norteamérica y Eurasia durante el verano septentrional. Mientras inverna en el verano meridional, se lo puede encontrar en el mar, llegando al borde sur del hielo antártico. La distribución de la especie cubre una superficie de aproximadamente dos millones de km².

CURIOSIDAD



El **charrán ártico** viaja más de 70.000 kilómetros en su migración anual de polo a polo (el equivalente de tres viajes de ida y vuelta a la luna durante toda su vida), en la que constituye la migración más larga del mundo animal, según un estudio de la "British Antarctic Survey" que se publica en la edición digi-


tal de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS). Cada año, estas pequeñas aves marinas viajan alrededor de 71.000 kilómetros desde Groenlandia hasta el Mar de Weddell, en las orillas de la Antártida, y vuelven a sus terrenos de apareamiento en Groenlandia.

VOCALIZACIONES

La especie tiene una buena variedad de vocalizaciones; las más comunes son las "voces de alarma", emitidas cuando existen posibles depredadores en las inmediaciones, como por ejemplo humanos u otros mamíferos, que entran a las colonias; y la "voz de aviso", emi-

tida cuando la ave vuelve a la colonia y también cuando se producen agresiones. Cada charrán tiene una voz de aviso propia, y tiene una función similar a la del canto de los pájaros, puesto que sirve para identificar individuos. Se han descrito ocho vocalizaciones más, implicadas en

conductas tan dispares como en el apareamiento o durante el ataque contra los intrusos.



"Cada charrán tiene una voz de aviso propia, y tiene una función similar a la del canto de los pájaros"

REPRODUCCIÓN

Los charranes árticos son monógamos (se emparejan con la misma pareja toda la vida), y en muchos casos vuelven a la misma colonia cada año. Empiezan a emparejarse a los tres o cuatro años de edad. El cortejo es elaborado,

especialmente en ejemplares que lo hacen por primera vez. Empieza con el que se denomina "alto vuelo", en el cual la hembra persigue el macho hasta una gran altitud y después desciende lentamente; este comportamiento es seguido

por "vuelos de pesca", en qué el macho ofrece pescado a la hembra. Cuando llega el cortejo a tierra se erizan lentamente con la cola levantada y las alas bajadas; tras lo cual, las dos aves suelen volar en círculos el uno alrededor del otro.





3. CHARRÁN ÁRTICO

Si quieres conocer más puedes ver un video en:

http://www.youtube.com/watch?v=nw2-Rxc_BsU

Los charranes árticos anidan en colonias en lagunas en la tundra y en las playas costeras. Cuando están en sus nidos, los charranes son vulnerables a la depredación por parte de gatos y otros animales. *Larus argentatus*, una gaviota más grande, además de ser un competidor por los lugares en los cuales nidifican, les roba huevos y polluelos. El camuflaje de los huevos contribuye a evitar esto, igual que construir los nidos en lugares aislados. Mientras se alimentan, los charranes árticos pueden ser acosados por miembros de la familia de gaviotas y otras especies de charrán, que intentan robarles la comida.

En la zona más meridional de su ámbito de distribución, las poblaciones de charrán ártico se han ido reduciendo. Gran parte de esto se debe a la carencia de alimentos. Aun así, la distribución de gran parte de estos pájaros se extiende por zonas muy remotas, y no parece haber ninguna tendencia de mengua en la población global.

PARA COLOREAR



¡No te pierdas la próxima semana: el perro de la pradera!